

Памятка пациента

Ривароксабан-ЭТ, таблетки,
покрытые оболочкой
(подчеркните прописанную дозу):

Ривароксабан-ЭТ 10 мг
Ривароксабан-ЭТ 15 мг
Ривароксабан-ЭТ 20 мг

**Всегда носите эту
карточку с собой.**

Покажите эту карточку своему
врачу, работнику аптеки,
стоматологу и любым
медицинским работникам,
которые Вас лечат

ЗАПОЛНИТЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ:

ФИО:
Адрес:
Дата рождения:
Вес:
Другие лекарственные препараты/состояния:
В случае чрезвычайной ситуации сообщите:
ФИО врача:
Телефон врача:
Штамп врача:
Ваше доверенное лицо:
ФИО:
Телефон:
Кем Вам приходится:

**Что необходимо знать о
препарате Ривароксабан-ЭТ?**

- Ривароксабан-ЭТ снижает вязкость крови, предотвращая формирование опасных тромбов.
- Ривароксабан-ЭТ следует принимать **СТРОГО** в соответствии с предписаниями врача. Чтобы обеспечить оптимальную защиту от тромбов, **ни в коем случае не пропускайте дозу.**
- Не рекомендуется прекращать прием препарата Ривароксабан-ЭТ без предварительной консультации с врачом, поскольку это может повысить риск образования тромбов.
- Перед началом лечения препаратом Ривароксабан-ЭТ, уведомите Вашего лечащего врача обо всех других лекарственных препаратах, которые Вы принимаете в настоящее время, принимали недавно или планируете принимать.
- Перед началом любой хирургической операции или инвазивного вмешательства сообщите врачу о том, что вы принимаете Ривароксабан-ЭТ.

Как принимать препарат Ривароксабан-ЭТ:

- 10 мг принимайте независимо от приема пищи
- 15 мг принимайте во время приема пищи
- 20 мг принимайте во время приема пищи

Информация для медицинских работников:

- Не следует полагаться на значения МНО (Международное нормализованное отношение), так как они не являются надежным индикатором антикоагулянтной активности препарата Ривароксабан-ЭТ.

В каких случаях Вам следует проконсультироваться с врачом

Принимая препараты, разжижающие кровь, включая Ривароксабан-ЭТ, важно знать о его возможных нежелательных реакциях - наиболее распространенным побочным эффектом является **кровотечение**.

Не начинайте лечение препаратом Ривароксабан-ЭТ без предварительной консультации с врачом, если у Вас повышен риск кровотечения.

СРОЧНО сообщите лечащему врачу о появлении любых признаков или симптомов кровотечения, таких как:

- Необъяснимая боль в области живота;
- Необъяснимая отечность, нарушение подвижности или боль в суставах;
- Необъяснимая головная боль, головокружение или слабость;
- Кровоподтеки, появляющиеся без причины или при небольших травмах и увеличивающиеся в размерах, носовые кровотечения, обильные кровотечения из десен, кровотечения при порезах, которые не останавливаются в течение более длительного времени, чем обычно;
- Более обильные, чем обычно, менструации, межменструальные кровотечения или кровянистые выделения из влагалища в период менопаузы;
- Наличие крови в моче, которая может иметь розовый или коричневый цвет, стул красного или черного цвета;
- Кровохарканье (выделение крови или сгустков крови при кашле), рвота с кровью или рвота, похожая на «кофейную гущу».

О любых нежелательных реакциях можно сообщить в компанию ООО «Эндокринные технологии» по следующим контактными данным:

Электронная почта: pv@endotech-pharm.ru

Телефон: +7 (495) 230-07-20 (по рабочему графику).