

Риск развития рака

Препарат Ранвэк® потенциально может увеличить риск развития рака, особенно рака кожи.

Сообщите своему врачу, если Вы заметите какие-либо изменения внешнего вида участка кожных покровов или рост новообразования на Вашей коже.

**Риск нарушения целостности стенок
желудочно-кишечного тракта**

Препарат Ранвэк® может увеличить риск нарушения целостности стенок желудочно-кишечного тракта. Незамедлительно свяжитесь со своим врачом, если у Вас возникла внезапная или необъяснимая боль в животе.

Показывайте эту памятку любому специалисту здравоохранения, оказывающему Вам медицинскую помощь, например, стоматологу или врачу скорой и неотложной помощи.

Свяжитесь со своим врачом, чтобы сообщить о любых нежелательных явлениях. Сообщая о нежелательных явлениях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Материал подготовлен компанией AbbVie.
Контактные данные ООО «ЭббВи»: Россия, 125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 7, этаж 4, помещение 1, телефон: +7 495 258-42-77, электронная почта: pv.russia.cis@abbvie.com.

JAКа-RU-00860-E
Дата одобрения: май 2025

ФИО пациента:

ФИО врача, назначившего препарат Ранвэк®:

Номер телефона врача:

Дата начала приема препарата Ранвэк®:

¹Листок-вкладыш препарата Ранвэк®, 15 мг, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой: https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=730f72ab-1041-4261-8581-d68bd54edc75.
Дата обращения: 07.04.2025.

Памятка пациента

Постоянно храните эту памятку при себе (или у лица, осуществляющего уход)

**Информация о безопасности препарата
Ранвэк® (упадацитиниб) для пациентов**

- Эта памятка содержит важную информацию о безопасности, которую Вам следует знать до и во время лечения препаратом Ранвэк®.
- Для получения дополнительной информации ознакомьтесь, пожалуйста, с листком-вкладышем препарата Ранвэк® ¹

Риск возникновения инфекций

Препарат Ранвэк® может ухудшить течение уже имеющейся инфекции или увеличить вероятность возникновения новой инфекции, например, туберкулеза, опоясывающего герпеса или вирусного гепатита.

Немедленно сообщите своему врачу, если Вы заметили признаки инфекции, такие как:

- лихорадка, потливость, озноб, потеря веса или кашель, который не исчезает — это могут быть признаки туберкулеза;
- болезненная кожная сыпь с волдырями — это может быть признак опоясывающего герпеса;
- чувство усталости или одышка — это могут быть симптомы пневмонии.

Сообщите своему врачу, если:

- Вам недавно диагностировали туберкулез или Вы когда-либо болели туберкулезом;
- Вы недавно находились в тесном контакте с человеком, больным туберкулезом.

Вакцины, используемые для профилактики инфекций

Живые вакцины (например, вакцина против гриппа в форме назального спрея, против ветряной оспы, кори/эпидемического паротита/краснухи) не следует применять во время лечения препаратом Ранвэк® или непосредственно перед началом приема препарата Ранвэк®.

Прежде чем вакцинироваться, проконсультируйтесь со своим врачом — ему должно быть известно, какие вакцины Вам не следует применять до или во время лечения препаратом Ранвэк®.

Риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы

Прием препарата Ранвэк® может привести к увеличению уровня холестерина в крови. Ваш врач будет проверять уровень содержания холестерина, пока Вы принимаете препарат Ранвэк®.

Немедленно сообщите своему врачу, если Вы заметили такие признаки, как боль или стеснение в груди, так как это может быть симптомом заболевания сердечно-сосудистой системы.

Контрацепция, беременность и кормление грудью

Препарат Ранвэк® нельзя принимать во время беременности.

- Используйте эффективные методы контрацепции во время лечения препаратом Ранвэк® и в течение 4 недель после приема последней дозы. Проконсультируйтесь со своим врачом касательно эффективных методов контрацепции.
- Если Вы планируете беременность или забеременели, немедленно сообщите об этом своему врачу.
- Не кормите грудью в период лечения препаратом Ранвэк®.

Риск образования тромбов в венах или легких

При приеме препарата Ранвэк® наблюдались случаи образования тромбов в венах или легких. Немедленно сообщите своему врачу, если Вы заметили признаки образования тромбов в венах или легких, такие как болезненная отечность ног, одышка или боль в груди.